

# AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE

**AUGMENTIN®** 500 mg/62,5 mg comprimé ou 1 g/125 mg sachet-dose

Ce médicament est un **antibiotique**

**Il ne doit pas être interrompu sans avis médical**

## VOTRE POSOLOGIE

.... comprimé(s) ou sachet(s)  
à .... mg /.... mg  
.... fois par jour **au début d'un repas**  
 Matin       Midi       Soir  
Pendant ..... jours  
Jusqu'au .... /.... /....

## EN CAS D'OUBLI

Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez la suivante à l'heure habituelle.

**Ne pas doubler** la dose suivante pour compenser la dose oubliée



## EN CAS DE VOMISSEMENTS

Si vomissements jusqu'à **1 heure** après la prise :  
➔ reprendre l'antibiotique

Si vomissements plus de **1 heure** après la prise :  
➔ ne pas reprendre l'antibiotique

Pendant la durée de votre traitement, **signaler** la prise de ce traitement à tout professionnel de santé que vous consultez.

**Ne pas arrêter** la prise de ce médicament **avant la date de fin** prescrite par votre médecin ou pharmacien.

En cas d'arrêt prématuré du médicament, risque : de reprise de l'infection, d'aggravation de l'état de santé, d'augmentation des résistances de la bactérie.

## EFFETS INDÉSIRABLES

**Digestifs** : Diarrhées, vomissements, nausées, douleurs abdominales, colites

**Cutanés** : Eruptions cutanées, pustules, urticaires, démangeaisons, prurit, gonflement, **mycoses**

**Neurologiques** : vertiges, céphalées, convulsions

**Biologiques** : Perturbations au niveau du foie, du rein, du potassium et sanguin

## PRÉCAUTIONS

**Réaction allergique** (éruption cutanée, Taches rouges ou violettes sur la peau, gonflement, malaise)

**Diarrhées** sévères et persistantes accompagnées de douleurs abdominales et fièvre

**Difficulté à uriner**

Bien **s'hydrater**



Attention à la conduite

**Avis médical**

## INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES



Si vous prenez les médicaments suivants,

<b>Anti-vitamines K (AVK)</b>	PREVISCAN® COUMADINE® SINTROM®	Réaliser des INR plus fréquemment
<b>Méthotrexate</b>	Augmentation des <b>effets et de la toxicité</b> du méthotrexate	
<b>Allopurinol ZYLORIC®</b>	Augmentation du risque de <b>réactions cutanées</b>	
<b>Mycophénolate mofétil CELLCEPT®</b>	Risque de diminution des effets du <b>Mycophénolate mofétil : Surveillance clinique</b>	
<b>Probénécide BENEMIDE®</b>	Risque d'augmentation de l' <b>effet et de la toxicité</b> de l'Augmentin®	
<b>Antiacides contenant du magnésium ou de l'aluminium</b>	MAALOX® PHOSPHALUGEL® ROCGEL® KEAL®	Laisser un intervalle de 2h entre ces médicaments

Liste non exhaustive

