

OFLOXACINE

OFLOCET® OFLOXACINE® 200 mg comprimé

Ce médicament est un **antibiotique**

Il ne doit pas être interrompu sans avis médical

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES



Si vous prenez les médicaments suivants,

Fer	TARDYFERON® TIMOFEROL®	Laisser un intervalle de 2h entre ces médicaments et l'ofloxacine
Antiacides	MAALOX® ROCGEL® KEAL®	
Pansements digestifs	GAVISCON® CARBOLEVURE® SMECTA®	
Compléments minéraux contenant magnésium, calcium	BEROCCA® MAGNEB6®	
Anti-Vitamines K (AVK) Fluindione Warfarine Acénocoumarol	PREVISCAN® COUMADINE® SINTROM®	Réaliser des INR plus fréquemment
Furosémide Méthotrexate	LASILIX® NOVATREX®	Augmentation des effets indésirables de l'ofloxacine
Mycophénolate mofétil	CELLCEPT®	Risque de diminution de l'efficacité du CELLCEPT®
Antidépresseurs Amitriptyline Clomipramine	LAROXYL® ANAFRANIL®	Risque de troubles du rythme cardiaque
Glucocorticoïdes Prednisone Prednisolone Méthylprednisolone	CORTANCYL® SOLUPRED® MEDROL®	Risque augmentation du risque de tendinopathie

Liste non exhaustive

VOTRE POSOLOGIE

... comprimé(s) à mg
... fois par jour **au cours ou en dehors d'un repas**

Matin Midi Soir

Pendant jours
Jusqu'au/...../.....

EN CAS D'OUBLI

Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez la suivante à l'heure habituelle.

Ne pas doubler la dose suivante pour compenser la dose oubliée



EN CAS DE VOMISSEMENTS

Si vomissements jusqu'à **1 heure** après la prise :
➔ reprendre l'antibiotique

Si vomissements plus de **1 heure** après la prise :
➔ ne pas reprendre l'antibiotique

Pendant la durée de votre traitement, **signaler** la prise de ce traitement à tout professionnel de santé que vous consultez.

Ne pas arrêter la prise de ce médicament **avant la date de fin** prescrite par votre médecin.

En cas d'arrêt prématuré du médicament, risque : de reprise de l'infection, d'aggravation de l'état de santé, d'augmentation des résistances de la bactérie

EFFETS INDÉSIRABLES

Douleurs musculaires, articulaires, tendinites (tendon d'Achille+++)

Cutanés : éruptions cutanées, urticaires, démangeaisons, **photosensibilisation**

Neurologiques : maux de tête, étourdissements, troubles du sommeil, convulsions, vertiges, troubles visuels

Digestifs : diarrhées, nausées, vomissements

Biologiques : perturbation au niveau du foie, rein et sang

Cardiaques : palpitations

Liste non exhaustive

PRÉCAUTIONS

Douleurs, inflammations tendons pendant et jusqu'à plusieurs mois après l'arrêt
Sensations battements du cœur irréguliers ou rapides

Avis médical

Éviter l'exposition au soleil pendant le traitement et les 2 jours suivant l'arrêt.

En cas d'exposition : Se couvrir (chapeaux, vêtements longs), et mettre crème solaire indice IP50+



Diabétique, risque d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie : Surveiller fréquemment la glycémie

Troubles de la vision Attention à la conduite



